

小児に投与が望ましくない医薬品(当院採用品)

参考 低出生体重児：2500g未満、新生児：出生後4週間未満、乳児：1歳未満、幼児：7歳未満、小児：15歳未満

薬効	商品名	一般名	剤形	対象
局所麻酔剤、鎮痛・鎮痒剤	アミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル	内用 外用	乳幼児
非ステロイド性 消炎・鎮痛剤	インドメタシン坐剤 12.5mg	インドメタシン	外用	小児(原則禁忌)
点鼻用 血管収縮剤	コールタイジン[スプレー]	塩酸テトラゾリン液(ブ レトニゾン含有)	外用	2歳未満の乳・小児
潰瘍性大腸炎 治療剤	スラマ錠	サラゾスルファピリジン	内用	低出生体重児 新生児
小児用 抗けいれん剤	ダイアップ坐剤 4mg	ジアセパム	外用	低出生体重児 新生児
小児用 抗けいれん剤	ダイアップ坐剤 6mg	ジアセパム	外用	低出生体重児 新生児
小児用 抗けいれん剤	ダイアップ坐剤 10mg	ジアセパム	外用	低出生体重児 新生児
広範囲 経口抗菌剤	タリビット錠 100mg	オフロキサシン	内用	小児等
全身 麻酔・鎮静用 剤	1%プロポフォール注	プロポフォール	注射	小児
呼吸促進剤	ドブラム注射液	塩酸ドキシプラム	注射	未熟児 新生児
麻酔用 神経遮断剤	ドロレブタン	ドロヘリドール	注射	2歳以下の乳児、小児
広範囲 経口抗菌剤	小児用バクシダール錠 50mg	ルフロキサシン	内用	乳児等
合成抗菌剤	バクタ錠	スルファメキサゾール・トリメ プリム	内用	低出生体重児 新生児
合成抗菌剤	バクタ顆粒	スルファメキサゾール・トリメ プリム	内用	低出生体重児 新生児
麻酔用鎮痛剤	フェンタネスト	フェンタニール	注射	2歳以下の乳児、小児
抗アレルギー剤	ペリアクチン100倍散	塩酸シロヘプタジン	内用	低出生体重児 新生児
抗アレルギー剤	ペリアクチンシロップ	塩酸シロヘプタジン	内用	低出生体重児 新生児
抗アレルギー剤	ペリアクチン錠4mg	塩酸シロヘプタジン	内用	低出生体重児 新生児
抗ヒスタミン剤	ポララミンシロップ	マレイン酸コルフェエラミン	内用	低出生体重児 新生児

小児に投与が望ましくない医薬品(当院採用品)

参考 低出生体重児：2500g未満、新生児：出生後4週間未満、乳児：1歳未満、幼児：7歳未満、小児：15歳未満

薬効	商品名	一般名	剤形	対象
抗ヒスタミン剤	ポララミン錠 2mg	マレイン酸クロルフェニラミン	内用	低出生体重児 新生児
中枢神経興奮剤	1% リタリン散「チバ」	塩酸メチルフェニデート	内用	6歳未満の幼児（原則禁忌）
中枢神経興奮剤	リタリン錠「チバ」10mg	塩酸メチルフェニデート	内用	6歳未満の幼児（原則禁忌）
止しゃ剤	ロペミンカプセル 1mg	塩酸ロペラミド	内用	禁忌：低出生体重児、新生児および6ヶ月未満の乳児 原則禁忌：6ヶ月以上2歳以下の乳幼児
止しゃ剤	ロペミン小児用	塩酸ロペラミド	内用	禁忌：低出生体重児、新生児および6ヶ月未満の乳児 原則禁忌：6ヶ月以上2歳以下の乳幼児