

**★卵アレルギー患者様に投与が望ましくない薬(当院採用医薬品)**平成15年4月現在

食物アレルギーの症状としては、摂取後に蕁麻疹、顔面紅潮、眼瞼浮腫、くしゃみ、咳嗽、喘息発作、嘔吐、腹痛などが出現し、重症例ではアナフィラキシーショックを呈します。これらの症状は、摂取直後より2時間以内に見られることが多いですが、なかには6時間後に遅発性に発症することもあります。

処方される場合、問診により患者のアレルギー歴を十分確認することが必要です。

商品名	一般名	対象飲食物	概要
ノイチーム顆粒	塩化リゾチーム	卵白	卵白由来成分の蛋白質のため
レフトーゼシロップ			
インフルエンザ HAワクチン	ワクチンの製造過程において、インフルエンザウイルスの増殖に孵化鶏卵を用いるために、わずかながら卵由来の成分が残存します。これによる卵アレルギーの副作用がごくまれに起こり得ます。近年は高純度に精製されているのでほとんど問題となりませんが、重篤な卵アレルギーがある場合、例えば鶏卵を食べるとひどい蕁麻疹や発疹を生じたり口腔内がしびれる人に対しては、接種を避けるか、注意して接種する必要があります。		