

レジメン名 TMZ150mg/m<sup>2</sup>(d1-5)Iri50mg/m<sup>2</sup>(d1-5)BEV10mg/kg(d1,15)(再発性髄芽腫)

コメント 止瀉薬併用

日数 血球の回復状況に応じて3-4週間隔

1病日 Day1		2病日 Day2		3病日 Day3		4病日 Day4		5病日 Day5		15病日 Day15	
注射	抗がん剤	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	【滴下順：1】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回	
	【滴下順：2】 中心静脈注射 テモダール点滴静注用 (100mg/V) 150m g /m <sup>2</sup> 大塚蒸留水【100mL/B】 1瓶 生理食塩液PL「ワ-」【100mL/B】 1瓶 1日1回 注入時間 1時間30分	【滴下順：3】 中心静脈注射 イリカン塩酸塩静注液 50m g /m <sup>2</sup> 生理食塩液P L「ワ-」 【100mL/B】 100mL 1日1回 注入時間 1時間									
	【滴下順：4】 中心静脈注射 アバスチン注 10mg/kg 生理食塩液P L「ワ-」 【100mL/B】 100mL 1日1回 注入時間 1時間30分									【滴下順：4】 中心静脈注射 アバスチン注 10mg/kg 生理食塩液P L「ワ-」 【100mL/B】 100mL 1日1回 注入時間 1時間30分	
	【滴下順：5】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回		【滴下順：5】 中心静脈注射 グラニセトロン静注液 1mg 1日1回								